



Затверджено  
Свідоцтво про Державну Реєстрацію  
№ 602-123-20-5 / 42172 від 05.10.2018р.

## ЛІНКОМІСТИН

### антибактеріальний, протигрибковий засіб

#### Склад:

Розчин для місцевого застосування 0,1%.

1 мл розчину містить:

- Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид моногідрат - 1 мг.
- Вода очищена

#### Форма випуску:

- 50 мл, 100 мл-флакони поліетиленові з наконечником.
- 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500мл - флакони поліетиленові у комплекті з насадкою-розпилювачем.
- 500 мл, 1000 мл - флакони поліетиленові.
- 5000 мл, 10.000 мл - каністри пластикові.

#### Фармакологічні властивості

##### Фармакодинаміка.

Виражена бактерицидна дія відносно грампозитивних і грамнегативних, аеробних і анаеробних, спороутворюючих та аспорогенних бактерій у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами.

В основі дії Лінкомістину лежить пряма гідрофобна взаємодія молекули з ліпідами мембран мікроорганізмів, що призводить до їх фрагментації і руйнування. При цьому частина молекули Лінкомістину, занурюючись у гідрофобну ділянку мембрани, руйнує надмембранний шар, розпушує мембрану, підвищує її проникність для високомолекулярних речовин, змінює ферментну активність мікробної клітини, інгібує ферментні системи, що призводить до пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів та їх цитолізу.

На відміну від інших антисептиків, Лінкомістин має високу вибірковість дії відносно мікроорганізмів, оскільки практично не діє на оболонки клітин людини. Цей ефект пов'язаний з іншою структурою клітинних мембран людини (значно більшою довжиною ліпідних радикалів, що різко обмежують можливість гідрофобної взаємодії Лінкомістину з клітинами). Лінкомістин чинить виражену антимікробну дію. Діє згубно на збудників захворювань, що передаються статевим шляхом: гонококи, бліди трепонеми, трихомонади, хламідії, а також на віруси герпесу, імунодефіциту людини. Чинить протигрибкову дію на аскоміцети роду *Aspergillus* і роду *Penicillium*, дріжджових грибів

(*Rhodotorula rubra*, *Torulopsis gabrata*) і дріжджоподібні гриби (*Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*), дерматофіти (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton schoenleini*, *Trichophyton violaceum*, *Epidermophyton Kaufman-Wolf*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum gypseum*, *Microsporum canis*), а також на інші патогенні гриби, наприклад, *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*), у вигляді монокультур і мікробних асоціацій. Під дією Лінкомістину знижується стійкість мікроорганізмів до антибіотиків.

##### Фармакокінетика.

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру і слизові оболонки.

#### Показання:

##### Для застосування в хірургії, травматології:

- профілактика нагноєнь та лікування гнійних ран;
- лікування гнійно-запальних процесів кістково-м'язової системи;
- лікування гнійно-запальних уражень м'яких тканин (абсцес, фурункул, карбункул).

##### Застосування в педіатрії:

- обробка пупка і промежини, попрілості, обробка пустушок, іграшок та елементів меблів (ті, які дитина тягне до рота), в момент прорізування зубів.

##### Для застосування в акушерстві, гінекології:

- профілактика і лікування нагноєнь післяпологових травм, ран промежини і піхви, післяпологових інфекцій;
- профілактика і лікування запальних захворювань (вульвовагініт, ендометрит).

##### Для застосування в комбустіології:

- лікування поверхневих і глибоких опіків II та III А ступенів;
- підготовка опікових ран до дерматопластики;

### **Для застосування в косметології:**

- профілактика запальних ускладнень при використанні ін'єкційних методів (мезотерапія, контурна пластика та ін.);
- профілактика запалень при пірсингу, депіляції, нанесення тату і перманентного макіяжу;
- профілактика і лікування запальних процесів при манікюрі та педикюрі;
- лікування вугрового висипу.

### **Для застосування в дерматології, венерології:**

- лікування пролежнів, дерматитів, вугрового висипу, гнійничкових бактеріальних і грибкових захворювань шкіри, гнійно-запальних уражень м'яких тканин (абсцес, фурункул, карбункул, флегмона, інфіковані рани);
- комплексне лікування кандидозу шкіри, мікозу стоп і великих складок;
- профілактика інфікування мікротравм шкіри;
- лікування і профілактика піодермії й дерматомікозів, кандидозів шкіри й слизових оболонок;
- індивідуальна профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом (в т.ч. сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, генітальний герпес, генітальний кандидоз).

### **Для застосування в подології:**

- для обробки шкірних покривів при алергії і запальних процесах;
- для профілактики та лікування бактеріальних і грибкових уражень шкіри та слизових оболонок.

### **Для застосування в урології:**

- комплексне лікування гострих і хронічних уретритів і уретро простатитів специфічної (хламідіоз, трихомоніаз, гонорея) і неспецифічної природи.

### **Для застосування в стоматології:**

- лікування і профілактика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота: стоматитів, гінгівітів, пародонтитів, періодонтитів;
- профілактика мікробних уражень після оперативних втручань на слизовій оболонці порожнини рота;
- гігієнічна обробка знімних протезів.

### **Для застосування в оториноларингології:**

- комплексне лікування гострих і хронічних отитів, гайморитів, тонзилітів, ларингітів.

### **Протипоказання:**

Індивідуальна чутливість до складових препарату.

### **Спосіб застосування та дози:**

При застосуванні в хірургії, травматології, комбустіології з профілактичною та лікувальною метою зрошують поверхню ран і опіків, пухко тампують рани й свищеві ходи, фіксують марлеві тампони, змочені препаратом. Лікувальна процедура повторюється 2-3 рази / добу протягом 3-5 днів. Високоєфективний метод активного дренивання ран і порожнин з добовою витратою до 1 л препарату.

При застосуванні в акушерстві, гінекології з метою профілактики післяпологової інфекції застосовується у вигляді вагінальних зрошень до пологів (5-7 днів), під час пологів після кожного піхвового дослідження та у післяпологовому періоді по 50 мл препарату у вигляді тампона з експозицією 2 години, протягом 5 днів. При пологах жінок шляхом кесаревого розтину, безпосередньо перед операцією обробляють піхву, під час операції - порожнину матки й розріз на ній, а у післяопераційному періоді тампони, змочені препаратом, вводять у піхву з експозицією 2 години протягом 7 днів. Лікування запальних захворювань проводиться курсом протягом 2 тижнів шляхом внутрішньо-піхвового введення тампонів з препаратом, а також методом лікарського електрофорезу.

Для профілактики венеричних захворювань препарат ефективний, якщо він застосовується не пізніше 2 годин після статевих актів. Вміст флакона за допомогою аплікатора урологічного ввести в сечівник на 2-3 хвилини: чоловікам (2-3 мл), жінкам (1-2 мл) і в піхву (5-10 мл). Обробити шкіру внутрішніх поверхонь стегон, лобка, статевих органів. Після процедури рекомендується не мочитися протягом 2 годин.

У комплексному лікуванні уретритів і уретро простатитів проводять вприскування в уретру 2-3 мл препарату 1-2 рази / добу, курс лікування - 10 днів.

При гнійних гайморитах - під час пункції верхньощелепна пазуха промивається достатньою кількістю препарату.

Тонзиліти, фарингіти та ларингіти лікують полосканням горлянки й / або зрошенням за допомогою насадки-розпилювача 3-4-кратним натисканням 3-4 рази / добу. Кількість препарату на 1 полоскання - 10-15 мл.

При стоматитах, гінгівітах, пародонтитах рекомендується полоскання ротової порожнини 10-15 мл препарату 3-4 рази на добу.

З лікувальною і профілактичною метою уражені ділянки обробляють Лінкомістіном 2-3 рази на добу за допомогою ватного або марлевого тампона.

### **Лікарська взаємодія:**

При одночасному застосуванні з антибіотиками відзначається посилення їх антибактеріальної та протигрибкової дії.

### **Побічні ефекти:**

Можливо: в окремих випадках короткочасне відчуття печіння, що зникає самостійно через 15-20 секунд і не потребує відміни препарату.

### **Передозування:**

Явища передозування не спостерігалися.

### **Умови та термін зберігання:**

Препарат слід зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ° С.

**Термін придатності:** 3 роки з дати виготовлення.

**Категорія продажу:** Без рецепта.

**Виробник:** [www.farmlink.ua](http://www.farmlink.ua)